
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ	PROCEDURĂ DE SISTEM		PS 25
	Procedură privind prognoza și avertizarea, inclusiv emiterea buletinelor de avertizare pentru combaterea organismelor dăunătoare culturilor agricole, horticole și forestiere		Versiunea: 1 Revizia: 0 Data aplicării: 10. 2021

B-dul Voluntari, nr. 11
Voluntari, 077190

Tel. +40(21) 270 3256
Fax. +40(21) 270 3254
www.anfd.ro

OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ
Tg. Mureș, Jud. Mureș, str. Dezrobirii, nr. 80



Tel/Fax 0265 435 245
ofmures@anfd.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 5 din 28.03.2022

Oficiul Fitosanitar Mureș recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura RAPIȚĂ DE TOAMNĂ împotriva complexului de agenți de dăunare (Gândacul roșu, purici de pământ, gărgărița tulpinilor, afide, putregaiul negru, cenușiu și alb, alternarioză, făinare).

Tratamentul este preventiv și curativ pentru boli iar pentru dăunători este curativ.

Tratamentul se va aplica pe parcelele în care s-a depășit pragul economic de dăunare (PED).

- putregaiul alb (*Sclerotinia sclerotiorum*) – 3% plante atacate;
- putregaiul negru (*Phoma lingam*) și putregaiul cenușiu al rapiței (*Botrytis cinerea*) – 5% plante atacate;
- făinarea (*Erysiphe cruciferarum*) și alternarioza (*Alternaria brassicae*) – 10% plante cu pete pe frunze;
- gărgărița tulpinilor de rapiță (*Ceuthorrhynchus napi*) – 1–2 adulți/ m²;
- puricele negru (*Phyllotreta atra*) – 10 – 20 purici/ m²;
- afide (*Brevicoryne brassicae*) – 5–10 plante populate.

Pentru combaterea agenților de dăunare se recomandă folosirea unei variante cu produse pentru protecția plantelor (omologate):

KARATE ZEON (NINJA) – 0,15 l/ha + ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) – 1,0 l/ha; sau
POLECI (DECA 2,5 EC) – 30–50 ml/100 l apă (0,03 – 0,05 %) + MATIZ (ERASMUS) – 1,0 l/ha; sau
INAZUMA -0,15 – 0,2 kg/ha + RIZA 250 EW (SPARTA 250 EW) – 1,0 l/ha./

Perioada optimă de tratament este creșterea intensă a plantelor – până la formarea butonilor florali.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul / instrucțiunile produselor de protecție a plantelor înainte de utilizare!

La prepararea soluțiilor de stropit utilizați numai apă din surse autorizate și verificate periodic (cu pH cuprins între 7 – 8).

Ambalajele din carton provenite de la ppp utilizate se vor plia iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, apa rezultată din clătire se va turna în rezervorul mașinii de tratat.

Ambalajele se vor depozita până la predarea acestora la predarea acestora la distribuitorul de ppp sau se pot preda și în campania “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro.

Pentru protejarea familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor se vor respecta prevederile legale conform legislației în vigoare.

Recomandăm accesarea site web: www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html

RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A MEDIULUI INCONJURĂTOR!

Șef serviciu
Dr. ing. Pogăcian Marian



Intocmit
Cons. sup. Bologa Vasile