



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Județul MUREȘ
Comuna com. Crăciunești
Nr. 4870 din 31.08.2020

Tel/Fax:0265.435245
ofmures@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 41 /25.08. 2020



În perioada care urmează se vor lua măsuri pentru combaterea dăunătorului **OMIDA PĂROASĂ A DUDULUI (Hyphantria cunea)**.

Omida păroasă a dudului este o specie polifagă, care atacă peste 130 specii de plante. Omizile rod frunzele pe care le înfășoară cu fire de mătase, formând cuiburi. În primele stadii larvele rod în interiorul cuiburilor, epiderma și parenchimul frunzei, lăsând una din epiderme intactă. Mai târziu larvele rod limbul foliar în întregime, lăsând doar nervurile mai groase. La atacuri puternice pomii sau plantele pot fi complet defoliați.

Dăunătorul atacă de preferință pomii izolați și bine luminați.

La apariția primelor cuiburi de omizi se impune tăierea și distrugerea acestora sau arderea lor cu prăjini lungi, prevăzute cu cârpe îmbibate în motorină.

După ce larvele se împrăștie în coroana pomilor, sunt necesare tratamente chimice cu unul din următoarele insecticide: **DIMILIN 48 SC – 0,02%** (0,2 l/ha) sau **FASTER 10 CE – 0,02%** sau **FURY 10 EC (MINUET) – 0,01%** sau **KAISO SORBIE 5 EG (REXARIS) – 0,015%** (0,15 kg/ha) sau **KARATE ZEON (NINJA) – 0,015%** (toate sunt clasificate X₁ - X_n).

Pentru tratament se pot folosi și alte insecticide omologate cu efect similar.

Tratamentele se efectuează la temperaturi sub 23⁰ C (dimineața și seara).

Nu se tratează chimic pomii a căror fructe sunt în faza de pângă-coacere, iar unde se tratează în mod accidental legume, etc., se respectă timpul de pauză de 7-21 zile până la consum, în funcție de remanența pesticidului folosit la tratament.

La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile și dozele recomandate și se vor citi cu atenție toate instrucțiunile pe ambalaj.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>

În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

COORDONATOR

Dr. ing. Pogăcian Marian

INTOCMIT

Costea Gherghina

BULETIN DE AVERTIZARE Nr 42 /26 .08. 2020

A) Tratamentul semintelor înainte de semănat este o primă măsură în protecția culturii de rapiță în tehnologiile modern.

Pentru protecția plantelor împotriva dăunătorilor de sol (puricii de pământ, musca radacinilor de varzoase, viespea rapitei), vă recomandăm tratarea semintelor înainte de semănat cu produsul **LUMIPOSA 625 FS** (ciantranilipol) în doza de **40 ml/500 000 semințe** (1,14 l/100 kg semințe).

B) Pentru combaterea pe vegetație a dăunătorilor: gândacul roșu (*Entomoscellis a.*), viespea rapitei (*Athalia r.*), purici (*Phyllotreta sp.*), afide, în caz de atac, recomandăm folosirea pentru tratament unul din produsele de protecția plantelor: **INAZUMA - 0,125-0,2 kg/ha** sau **DELMETROS 100 SC (KORON 100 SC) - 0,05 l/ha** sau **FASTAC 10 EC - 0,075 - 0,2 l/ha** sau **FASTER 10 CE - 0,2 l/ha**.

La faza de 4-6 frunze a plantei, se aplică un tratament cu **CARAMBA TURBO -1,0 l/ha** sau **MAGNELLO - 0,6-0,8 l/ha** sau **TOPREX - 0,5 l/ha** care asigură controlul eficient al bolilor (înnegrirea tulpinilor, putregaiul alb, putregaiul cenușiu, putregaiul negru alternarioza, fainarea) + regulator de creștere și mărește rezistenței plantelor la iernare sau **TILMOR 240 EC (CORINTH 240 EC) - 1,0 l/ha** sau **FOLICUR SOLO EW 250 (VALOR 250 EW) - 0,5 l/ha** sau **MYSTIC PRO (ARES PRO) - 0,625 l/ha** sau **ORIOUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) - 0,5-1,0 l/ha**.

Pentru utilizare se vor folosi produse omologate cu efect similar oferite spre vânzare de societățile comerciale autorizate.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>
<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>

RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR !

COORDONATOR
Dr. ing. Bogăcian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina

